

Actualité sur l'épidémiologie du VIH/sida

Unité VIH-IST-VHC-VHB chronique, DMI, Institut de Veille Sanitaire

Réunion des Associations
Jeudi 19 Novembre 2009



Surveillance du VIH/sida

un nouvel indicateur est disponible en 2009

- Depuis 1986 : notifications des diagnostics de sida
- Depuis 2003 : notifications des découvertes de séropositivité (c'est-à-dire des nouveaux diagnostics d'infection à VIH)
 - Depuis 2008 : l'information sur le nombre des CD4 au moment du diagnostic est recueillie auprès des cliniciens
- Pour la première fois en 2009, on dispose du nombre des nouvelles contaminations par le VIH

Evolution des indicateurs de la surveillance depuis 1986






Les cas de sida et les découvertes de séropositivité

Evolution 2003-2008 et caractéristiques
des personnes diagnostiquées


Les cas de sida ne diminuent plus en 2008



1 550 nouveaux cas de sida ont été diagnostiqués en 2008

Source : InVS, déclaration obligatoire du sida, données au 31/12/2008 corrigées pour les délais et la sous déclaration

Le nombre de découvertes de séropositivité est stable entre 2007 et 2008




6 500 personnes découvrent leur séropositivité en 2008

Source : InVS, déclaration obligatoire du VIH, données au 31/12/2008
corrigées pour les délais, la sous déclaration et les données manquantes

Les découvertes de séropositivité en 2008

Les départements français d'Amérique et l'Île-de-France sont les régions les plus touchées




Nombre de découvertes par millions d'hab.

Source : InVS, déclaration obligatoire du VIH, données au 31/12/2008 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les données manquantes

Les découvertes de séropositivité


Stabilisation chez les homosexuels et diminution chez les femmes
hétérosexuelles étrangères



Source : InVS, déclaration obligatoire du VIH, données au 31/12/2008
corrigées pour les délais, la sous déclaration et les données manquantes

Les populations les plus concernées par le VIH en 2008

Les homosexuels masculins et les hétérosexuels étrangers



■ rappports hétérosexuels ■ rappports homosexuels
■ injection de drogues ■ autres

Parmi les 60% contaminés par rapports hétérosexuels :



- 47% d'hommes
- 58% d'étrangers

Source : InVS, déclaration obligatoire du VIH, données au 31/12/2008 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les données manquantes

Les populations les plus touchées par le VIH en 2008

Les homosexuels masculins et les hétérosexuels étrangers

Taux de découvertes de séropositivité en 2008 pour 100 000 personnes




Source : InVS, déclaration obligatoire du VIH au 31/12/2008
corrigées pour les délais de déclaration et la sous-déclaration et les données manquantes

Homosexuels masculins

Découvertes de séropositivité en 2008

2500 homosexuels masculins diagnostiqués en 2008 (37% des cas)

Le nombre total est stable depuis 2 ans...



.. mais une tendance à la hausse chez les plus jeunes



Homosexuels masculins


Découvertes de séropositivité en 2008

- 90% d'entre eux sont français
- 1 sur 3 a été diagnostiqué lors d'un dépistage réalisé en raison d'une prise de risque
- la part des diagnostics au stade clinique du sida a diminué de 16% à 8% entre 2003 et 2008
 - mais chez les HSH de plus de 50 ans, 1 sur 5 est diagnostiqué au stade sida en 2008

Personnes d'Afrique subsaharienne

Découvertes de séropositivité en 2008

- 1 900 personnes d'Afrique subsaharienne diagnostiqués en 2008 (parmi les 2 700 personnes de nationalité étrangère)
- la part des personnes d'Afrique subsaharienne a diminué depuis 2003 (de 40% à 29%)



Source : InVS, déclaration obligatoire du VIH, données au 31/12/2008 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les données manquantes



Usagers de drogues

Découvertes de séropositivité en 2008

- Une centaine d'usagers de drogues diagnostiquée en 2008
- Le nombre de diagnostics diminue depuis 2003
- 77% sont de nationalité française, 10% d'un pays d'Europe de l'Est et 6% d'Afrique du nord
- Ont en moyenne 39 ans et sont souvent diagnostiqués trop tardivement : 28% au stade sida




Hétérosexuels français

Découvertes de séropositivité en 2008

- 700 femmes françaises et 1000 hommes français ont été diagnostiqués en 2008
- Le nombre diminue chez les femmes et fluctue sans tendance particulière chez les hommes
- Les hommes sont plus souvent diagnostiqués au stade sida (21%) que les femmes (12%)
- Partenaire sexuel/le d'Afrique subsaharienne pour la moitié d'entre eux *(mais on ne dispose de l'info que pour 40% des hétérosexuels français en 2008)*

Retard au diagnostic


Près d'une personne sur trois (29%) découvre sa séropositivité à un stade avancé de l'immunodépression ($CD4 < 200/mm^3$), en 2008



Le taux des CD4 au moment de la découverte de séropositivité est recueilli depuis 2008 (disponible pour 45% des cas)


Un retard au diagnostic plus important chez les usagers de drogues et les hommes hétérosexuels

Proportion de taux de CD4 < 200/mm³ en 2008 en fonction du mode de contamination



Source : InVS, déclaration obligatoire du VIH au 31/12/2008 corrigées pour les délais de déclaration et la sous-déclaration et les données manquantes

Un retard au dépistage malgré un nombre très élevé de sérologies VIH réalisées en France



Près de 5 millions de tests VIH réalisés en 2008, soit un ratio de 80 tests pour 1 000 hab.

Conclusion

- 6500 personnes ont découvert leur séropositivité en 2008 dont 2 500 homosexuels et 1900 personnes d'Afrique subsaharienne qui représentent les populations les plus touchées en France (respectivement 72 pour 10 000 et 44 pour 10 000)
- Le nombre de découvertes de séropositivité, de diagnostics de sida et de tests de dépistage du VIH sont stables entre 2007 et 2008
- Le nombre de diagnostics de syphilis, de gonococcies et de lymphogranulomatose vénérienne rectale notifiés à travers les systèmes de surveillance (notamment Renago, ResIST) est également stable sur 2007/2008

Conclusion

- Même si le nombre de nouveaux diagnostics est faible chez les usagers de drogues, si l'on rapporte ce nombre de découvertes au nombre estimé d'UD en France (79 découvertes pour 100 000 UD), cette population reste très marquée par l'infection à VIH et peut encore échapper au dépistage du VIH (près de la moitié présente un nombre de $CD4 < 200$ au moment du diagnostic)
- Près d'un tiers (29%) des personnes sont diagnostiquées à un stade trop avancé de la maladie en 2008 (taux de $CD4 < 200$), et plus d'un tiers chez les hommes hétérosexuels français ou étrangers (39%)